

ПАМЯТКА ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА ВЫСОКОПАТОГЕННОГО ГРИППА ПТИЦ



ГРИПП ПТИЦ - это острая инфекционная болезнь птиц, которая характеризуется поражением дыхательных путей, пищеварительной системы и высокой летальностью.

К гриппу восприимчивы все виды птиц в т.ч. домашние, дикие, экзотические и декоративные птицы, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и человек.

Источник инфекции – больные и переболевшие птицы.

Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и может протекать у них бессимптомно, однако среди домашних птиц может вызывать тяжелое заболевание и 100% гибель.

Основным источником вируса в природе являются водоплавающие птицы, которые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной и пометом, при этом никаких видимых клинических признаков заболевания у самих птиц вирус не вызывает!

Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой дикой или домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки!!!

Выделения зараженных птиц, попавая на растения, в воздух, в воду, могут заразить человека и здоровую птицу через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки!!!

Вирус гриппа очень устойчив во внешней среде - в тушках мертвых птиц он может жить до одного года, длительно сохраняется в тканях, фекалиях и воде.

Клинические признаки: отмечается угнетенное состояние, сонливость, истечение тучней слизи из клюва, конъюнктивит, повышение температуры тела, диарея, отеки подкожной клетчатки в области головы, шеи, груди, отек гортани, цианоз (синюшность) гребня, бородак и лап, шаткость походки, судороги, парезы и параличи. У кур несущек резко снижается продуктивность. Гибель птицы наступает в течение 24-72 часов.

Инфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной или вызывать уменьшения яйценоскости и заболевания дыхательной системы, а также протекать в молниеносной форме, вызывая быструю гибель птицы без каких-либо признаков.



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ У ЧЕЛОВЕКА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ГРИППОМ ПТИЦ:

От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание начинается с озноба, повышения температуры до 38°C и выше, мышечных и головных болей, боли в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Через 2-3 дня появляется затрудненное дыхание, влажный кашель, часто с примесью крови. Опасен такой вирус тем, что он очень быстро может привести к пневмонии, а кроме того, может давать тяжелые осложнения на сердце и почки, поражает головной мозг.


ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАРАЖЕНИЯ ПТИЦЫ ГРИППОМ НЕОБХОДИМО:



- Соблюдать санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм содержания;
- не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределами дворовой территории, исключить контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими;
- осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы в местах санкционированной торговли только при наличии ветеринарных сопроводительных документов;
- обеспечить засечивание окон и дверей, исключающее возможность попадания дикой и синантропной птицы в помещения для хранения кормов и содержания птицы;
- хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях, недоступных для контакта с дикой птицей.


Пищевые отходы перед скормливанием необходимо прокипятить:

- убой домашней птицы, предназначенной для реализации в торговле, должен осуществляться на специализированных предприятиях;
- соблюдать правила личной гигиены;
- периодически проводить дезинфекцию предварительно очищенных помещений и инвентаря.



При обнаружении трупов птицы или выявления больной птицы на улице, в личных подсобных хозяйствах необходимо незамедлительно сообщать в государственную ветеринарную службу района по месту обнаружения птицы в целях проведения необходимых мероприятий по ис- следованию птицы на грипп.

ПОМНИТЕ! СМЕРТНОСТЬ ПОГОЛОВЬЯ ПТИЦЫ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 100%



2. ЧИСТОТЫ


От дараживания до появления первых признаков болезни может пройти от 3 до 15 суток. При сильном течении болезни возможны выделения из носа, жидковатые слезы в течение 1—5 дней после появления симптомов; повышенная температура тела до 42 °С, учащенное дыхание и повышенное количество разлитых ушных выделений, чаще ушей, подгузник, живота и конечностей. Также могут наблюдаться помехи с приемом пищи, кашель, проявление отекаания на носу, слезности, покраснения конъюнктивы.

2. ЧИСТОТЫ

От дараживания до появления первых признаков болезни может пройти от 3 до 15 суток. При сильном течении болезни возможны выделения из носа, жидковатые слезы в течение 1—5 дней после появления симптомов; повышенная температура тела до 42 °С, учащенное дыхание и повышенное количество разлитых ушных выделений, чаще ушей, подгузник, живота и конечностей. Также могут наблюдаться помехи с приемом пищи, кашель, проявление отекаания на носу, слезности, покраснения конъюнктивы.

3.3 Materie

В этом случае, необходимость в достижении и развитии, не исключившие мышление отсюда: самизм, тем более по-лучательные из коммунистических с точки зрения обеспечения биологического обеспечения, пункта общественного пита-ния (продовольствие, кафе, шашлычные и т.д.).



4. Меры при установлении диагноза

При проведении капитальных мероприятий подлежат инвентаризации материальный инвентарь и дефицитные постройки.


Важно знать, что проведение деинфекции подпольных помещений (сарая, хлевов, базов и т. д.), построенных из материалов, имеющих пористую структуру (саманная кирпич, пенобетон, ячеистый кирпич, керамзитобетонные блоки (кроме облитых), и т. д.), не гарантирует уничтожения возбудителя вируса в силу его способности глубоко проникать в структуру указанных строительных материалов и надолго оставаться в них.

5. Что значит?

1. осуществлять мониторинг и закреплять положительные изменения в производственных и управленческих процессах, не допускать свободного выпадения сил, контактируя не с другими жителями, а с самим собой;

100 WHITE

Только строгое выполнение указанных рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на Ваши подпоры и позволит избежать административной и уголовной ответственности.



9. обеспечивать присутствие поголовья скотины для эффективного контроля производства антиципаций (прямые классические чумы скотины, рожи) и других обработок.

10. не выселять трупы животных, отследи от их содержания и передвижения на скотных обочинах дорог, проводить уничтожение биологов в местах определенных заболеваний скотной скотины последних.

4. не перерабатывать массу пшеницы или выжиганию убитых семян — это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни.

12. не использовать для хранения материалов дощатые ящики и деревянные ящики от сельскохозяйственных предприятий, не прошедшие проверку в санитарно-эпидемиологическом надзоре;

1) Не все промышленные предприятия имеют возможность использовать в качестве сырья и топлива отходы других предприятий. В связи с этим возникает необходимость создания специальных предприятий, которые бы принимали отходы и перерабатывали их в сырье и топливо для других предприятий. Это предприятие не только не загрязняет окружающую среду, но и на выходе дает сырье и топливо, пригодные для использования в промышленности.